

# 登革熱/屈公病/茲卡病毒感染症病媒蚊

埃及斑蚊

白線斑蚊

胸部背側有一對彎曲白線條紋及中間2條縱線


胸部背面有一條白線



(雌蚊平均壽命約 30天)

腳上有黑白相間的斑紋亦叫花腳蚊

## 斑蚊產卵的習性




斑蚊產卵(黑色)於容器內壁接近水面處，乾燥時最長可存活一年(因卵具硬殼，可耐旱)，當水面再度超過卵線，蟲卵會在幾分鐘內孵化。  
**所以清洗容器時，需特別刷洗內壁。**

**「巡」**  
檢查居室內外可能積水的容器


**「倒」**  
倒掉積水，並將無用的器物予以回收

**「清」**  
減少容器使用過需澈底清潔

**「刷」**  
刷除蟲卵避免積水養蚊



成蟲期



卵期


3-4天

幼蟲有一定的抗旱能力，在濕土上可存活13天之久，所以殘留在水缸底部的幼蟲不易被殺死，因此應認真刷洗和反複沖洗容器。



幼蟲期

俗稱孑孓或水蟲



蛹期

5-6天

1-2天

9-12天

25

Taiwan CDC  
http://www.cdc.gov.tw

## 水生植物的積水容器

室內孳生源

改變種植方式，一勞永逸清除孳生源



須每週換水並沖洗植物莖部，同時刷洗容器內壁以清除蟲卵



可利用小石頭種植，水不可超過石頭



可利用遇水會膨脹的膠質物來種植，以後只要定期澆水施肥，並補滿膠質物。

# 含DEET防蚊液介紹

	衛生福利部核准	環保署核准
分類	指示用藥	一般環境衛生用藥
許可證字號	衛署藥製	環署衛製、環署衛輸
成分名	待乙妥	敵避
濃度	10%~50%	5%~15%
防治效能	驅逐蒼蠅、蚊、蚤、蝨、水蛭、蚋、小飛蟲、蝨、蚤、臭蟲、蟻等	蚊子、小黑蚊忌避。
使用方法	距離皮膚或衣服約10-15公分處噴灑；同時噴灑於衣服袖口及褲管處可增加效果。	居家或室內時，可噴灑於紗窗或紗門上；露營時，可噴灑於帳篷上。屬於「一般環境衛生用藥」，故不能噴灑於皮膚上，只能噴灑於四周環境或紗窗上。

成分濃度	保護時間
DEET 30 %	6 小時
DEET 15 %	5 小時
DEET 10 %	3 小時
DEET 5 %	2 小時
香茅精油 5-10%	0.3-0.5 小時
lemon eucalyptus 10-30%	2-5 小時

- 應選用含DEET且有衛生福利部許可證的防蚊產品。

## 選購防蚊液要看清楚！ 記得選用政府核可的防蚊藥劑喔！

目前政府核可的防蚊藥劑有三種：

含有DEET/diethyltoluamide  
(敵避/待乙妥)

picaridin(派卡瑞丁)

IR3535(伊默克)

### 衛生福利部核准防蚊藥劑

(印有「衛(部)署藥製」或「衛(部)署藥輸」等字號)

可直接塗抹噴灑於人體或皮膚



### 環境保護署核准防蚊藥劑

(印有「環署衛製」或「環署衛輸」等字號)



分為「人用化學防蚊液」及「環境衛生用藥防蚊液」，須留意說明書上的適用範圍及使用方法，要注意是否加註說明「得使用於人體裸露之皮膚」或「本產品不可噴灑於皮膚或衣物上」

不論使用哪一種防蚊藥劑，均應依照說明書的指示使用，並留意使用年齡限制。

