

## 十一、臺灣藥樹椿象類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.5 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.8 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.8 公斤	1,800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
75%陶斯松 水分散性粒劑* (Chlorpyrifos)	0.2-0.4 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
16%可尼丁 水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
20%免扶克乳劑* (Benfuracarb)	0.8-1.9 公升	800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
25%免扶克 可濕性粉劑* (Benfuracarb)	0.6-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
40%免扶克水懸劑* (Benfuracarb)	0.4-0.9 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.9-2.1 公斤	700	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.2-0.4 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
48.34%丁基加保扶 乳劑* (Carbosufan)	0.6-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
48.34%丁基加保扶 水基乳劑* (Carbosufan)	0.6-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
25%丁基加保扶 可濕性粉劑* (Carbosufan)	0.8-2 公斤	750	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
40%丁基加保扶 可濕性粉劑* (Carbosufan)	0.5-1.3 公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.1-0.2 公斤	7,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.2-0.4 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
10%氟尼胺 水分散性粒劑* (Flonicamid)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	
9.6%益達胺 水懸劑* (Imidacloprid)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.1-0.3 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免於開花期使用。

\*延伸使用藥劑

TACTRI