

卡介苗

卡介苗接種之禁忌症

- 1.發燒。
- 2.患有嚴重急性症狀及免疫功能不全者。
- 3.出生時伴有其他嚴重之先天性疾病。
- 4.新生兒體重低於 2500 公克時。
- 5.可疑之結核病患，勿直接接種卡介苗，應先做結核菌素測驗。
- 6.嚴重濕疹。

卡介苗接種後可能發生的反應及注意事項

- 1.接種後 7-14 天在接種部位有紅色小節結。
- 2.紅色小節結逐漸長大，微有痛癢，4-6 週可變成膿泡或潰瘍，不可擠壓或包紮，只要保持局部清潔，用無菌紗布或棉球擦拭即可，經 2-3 月潰瘍會自然癒合，有時同側腋窩淋巴腺會腫大，可請醫師檢查。
- 3.如果接種部位腫脹厲害有感染情形時，則請醫師檢查。

未接種卡介苗可能引起的後果

結核病是一種經由開放性肺結核的病人咳嗽、打噴嚏時將病菌的飛沫散佈在空氣中，如果沒有抵抗力的人吸入後，可能造成感染。臺灣地區於民國七十三年之前，結核病一直都在十大死亡原因之內，對民眾的生命、健康仍是一大威脅。

在極微小的機率下，若接種一個月後有腋下或全身淋巴腺腫大或接種處局部嚴重糜爛，請至醫院診治，並通知衛生局預防接種諮詢專線：25265394 或各鄉鎮衛生所，若確定為疑似預防接種引起之嚴重副作用，可申請行政院衛生署之「預防接種受害救濟」。