


**桃園市政府衛生局 113 年第 1 次護理師
公共衛生學暨衛生所執行實務試題**

選擇題 40 題		
(C)	1.	44 歲設籍桃園市男性具有重度吸菸史，偶嚼檳榔，從未接受過政府提供的免費預防保健服務，您建議他可以接受哪些預防保健服務項目？ ① 肺癌檢查。 ② 成人健康檢查。 ③ 糞便潛血檢查。 ④ 口腔黏膜檢查。 (A) ①②③④ (B) ①②③ (C) ①②④ (D) ②③④
(B)	2.	有關登革熱及相關防治工作之敘述，下列何者為非？ (A) 落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會。 (B) 登革熱係屬第三類法定傳染病。 (C) 如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。 (D) 進行戶外活動時，建議使用政府機關核可含 DEET、Picaridin 或 IR-3535 等有效成分之防蚊藥劑。
(A)	3.	在登革熱流行期，社區衛生護理人員應著手進行下列哪些工作？ ① 辦理登革熱衛教宣導活動。 ② 定期進行轄區病媒蚊孳生源清除與查核。 ③ 拜託轄區醫療院所，提供海報或宣導單張及提醒醫師注意疑似病例之通報。 ④ 對於轄內自疫區(高流行區)返國民眾進行採血工作。 ⑤ 聯繫環保單位，進行環境噴藥。 (A) ①②③




		(B)①③④ (C)①②⑤ (D)①③⑤
(A)	4.	下列哪些項目是屬於公共衛生三段五級預防中的「健康促進」？ ① 銀髮族運動班。 ② 流感疫苗注射。 ③ AD-8 極早期失智症篩量表。 ④ 衰弱評估。 ⑤ 老人健康檢查。 ⑥ 宣導「我的餐盤」聰明吃營養跟著來。 (A)①⑤⑥ (B)②③④ (C)①②③ (D)③④⑤
(C)	5.	有關麻疹的敘述，以下何者錯誤？ (A) 通報為疑似麻疹病人在可傳染期(出疹前後 4 天)應接受居家或住院隔離並採取適當防護措施，就醫時，以有負壓隔離設施之醫療機構為原則。 (B) 麻疹臨床表現的皮疹症狀，由頸部向四周擴散到全身，為離心式擴散及向心式分布，嚴重者皮疹有融合現象(confluence)，常留下落屑。 (C) MMR 疫苗為不活化疫苗，保存溫度在 2~8℃。 (D) 麻疹的病原為 RNA 病毒，潛伏期 7-18 天，具高度傳染力，屬於第二類法定傳染病需要 24 小時內通報。
(A)	6.	菸害防制法新法於 112 年 3 月 22 日起正式上路，部分條文緩衝期一年，於今 113 年 3 月 22 日開始正式施行，請問針對該法規之規範，下列敘述何者為非？ (A) 擴大菸盒警示圖文面積至 35%。 (B) 提高禁菸年齡至 20 歲。 (C) 菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物。 (D) 擴大禁菸之室內外公共場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸。




(B)	7.	有關結核病雲端都治之描述，下列何者正確？ (A)雲端都治只適用 13-65 歲之潛伏結核感染治療個案及移動式結核病個案(例如：遊覽車司機、臺商等)。 (B)使用雲端都治者，關懷員仍需觀察服藥副作用，並依實際都治情形填寫都治日誌。 (C)使用雲端都治者，衛生所相關人員需要每半年進行家訪。 (D)以上皆是。
(B)	8.	下列死因統計名詞定義何者錯誤？ (A)粗死亡率(0/0000)：$(\text{死亡數}/\text{年中人口數}) \times 100,000$ (B)孕產婦死亡率(0/0000)：$(\text{孕產婦死亡數}/\text{孕產婦人數}) \times 100,000$ (C)新生兒死亡率(0/00)：$(\text{新生兒死亡數}/\text{活產嬰兒數}) \times 1000$ (D)嬰兒死亡率(0/00)：$(\text{嬰兒死亡數}/\text{活產嬰兒數}) \times 1000$
(C)	9.	以下何者為自殺防治的主要服務內容？ (A) 提供自殺意念者長期追蹤關懷訪視。 (B) 提供經濟困難個案急難救助金。 (C) 根據自殺危險分級及個案需求提供服務。 (D) 強制自殺個案就診精神科。
(C)	10.	依據食品安全衛生管理法之規定，醫療機構診治病人時發現有疑似食品中毒之情形，對當地主管機關應： (A)立即通報。 (B)12 小時內通報。 (C)24 小時內通報。 (D)視情況決定是否通報。
(A)	11.	有關國民健康署推動長者量六力之敘述，下列何者為非？ (A)參考世界衛生組織(WHO)長者整合式照護(ICOPE)策略，針對長者六大能力「認知、行動、營養、視力、聽力及社交技巧」建立評估模式，整合為一套「長者功能評估」。 (B)透過這個評估工具(ICOPE)可以早期發現功能衰退，及早介入運動、營養飲食及社交互動等活動，預防延緩失能。




		(C)這個評估工具(ICOPE)除了可以由醫事人員評估，長者、家屬及主要照顧者也可以自己在家評估長輩有無衰退徵兆。 (D)依照國民健康署近期長者量六力評估的統計發現，長者以視力、聽力異常率較高。
(D)	12.	有關 HPV 疫苗接種之說明，下列何者為非？ (A)根據世界衛生組織（WHO）建議，針對 9-14 歲性行為尚未活躍女性接種 HPV 疫苗，預防效果較佳。 (B)國民健康署自 113 年 2 月起針對 111 年入學之國中女生提供校園接種第 2 劑 HPV 疫苗服務。 (C)目前提供的公費疫苗，保護力至少 8 年以上。 (D)HPV 疫苗是活性疫苗，不可以與其他非活性或活性疫苗如 A 型肝炎、B 型肝炎、白喉、以及流感等疫苗一起接種。
(A)	13.	有關結核病七分篩檢法的項目，下列何者為非？ (A)咳嗽一週。 (B)胸痛。 (C)體重減輕。 (D)沒有食慾。
(B)	14.	針對衛生福利部 113 年公布最新臺灣社區失智症流行病學調查結果的敘述，下列何者為非？ (A)社區 65 歲以上長者失智症盛行率將近 8%。 (B)失智症類型以巴金森氏症失智症(Parkinson disease dementia)最多。 (C)女性失智症盛行率為高於男性。 (D)社區長者失智症人口會逐年攀升。
(B)	15.	依據病人自主權利法規定，有關輕度認知障礙者事先預立醫療決定的敘述，下列何者正確？ (A)18 歲以上者都可以簽署預立醫療決定，該法自 110 年 1 月 1 日起正式實施。 (B)意願人簽署「預立醫療決定」前，須先經醫療機構「預立醫療照護諮商」。 (C)家屬可全權代理簽署「預立醫療決定」文件。 (D)有認知障礙者不能簽立「預立醫療決定」。




(D)	16.	負責我國人口推估的部門是？ (A)內政部。 (B)衛生福利部。 (C)國家衛生研究院。 (D)國家發展委員會。
(D)	17.	有關疥瘡 (scabies) 的治療，下列敘述何者為是？ (A)滅疥藥膏不須塗抹全身。 (B)強效類固醇藥膏是首選藥物。 (C)同住的家人不須做預防性治療。 (D)使用過衣服、被褥要用超過 60°C 以上之熱水清洗至少 10 分鐘。
(A)	18.	下列何者非屬長期照顧服務給付支付的服務項目？ (A)住宿式長照機構住民每年最高 12 萬元補助。 (B)輔具及居家無障礙環境改善每 3 年最高 4 萬元補助。 (C)往返居家至醫療院所就醫、復健之交通接送服務。 (D)醫事人員至失能個案家中指導個案及照顧者學習自主獨立或照顧技巧之復能照護服務。
(B)	19.	有關 2025 衛生福利政策白皮書中，針對健全青少年健康發展策略及目標，下列敘述何者為非？ (A)營造校園無菸支持環境，推動校園周邊無菸人行道。 (B)限定校園外周邊店家應販售健康食品。 (C)加強提供偏鄉地區青少年性健康教育及避孕服務。 (D)推動健康促進學校國際認證。
(C)	20.	依據長期照護機構感染管制措施指引規範，當環境表面有小範圍 (<10ml) 的血液或體液時，需使用多少濃度漂白水覆蓋在其表面？ (A) 10PPM。 (B) 100PPM。 (C) 500PPM。 (D) 1,000PPM。
(A)	21.	依據精神衛生法，下列哪種個案需設定保護人？ (A)經專科醫師診斷屬嚴重病人者。 (B)智能不足者。 (C)經醫師診斷為失智症者。




		(D)6 歲以下兒童。
(B)	22.	有關衛生福利部 113 年衛生教育主軸宣導計畫之重點工作，下列何者正確？ (A)「預防衰弱-高齡營養及長者健康促進」。 (B)「兒童發展篩檢及聯合評估服務」。 (C)「認識失智症」。 (D)「C 肝篩檢與防治」。
(A)	23.	餐飲從業人員於僱用期間，有下列何種疾病者，不得從事與食品直接接觸之工作？①傷寒 ②A 型肝炎 ③結核病 ④B 型肝炎 ⑤糖尿病 ⑥手部皮膚病 (A)①②③⑥ (B)①②⑤⑥ (C)①③④⑤ (D)②③④⑥
(D)	24.	2022 年 6 月 22 日公布之醫療事故預防及爭議處理法，法案內容三大原則，以下何者為非？ (A)即時關懷。 (B)調解先行。 (C)事故預防。 (D)公平正義。
(D)	25.	巴氏量表(Barthel Index)為一種日常活動能力之評估指數，始用於 1950 年代，沿用至今，以下相關敘述，何者為正確？ (A)共包含五大項，每項分二至三級，滿分是 100 分。 (B)項目內容包括個人衛生、大小便控制、移動能力、食物烹調、財物處理等。 (C) 0~20 分為嚴重依賴，100 分為完全獨立。 (D) 61~90 分為中度依賴，91~99 為輕度依賴。
(C)	26.	衛生局辦理登革熱防治計畫，下列何者屬於成效面的評估指標？ (A)辦理社區衛教宣導場次。 (B)參與校園容器減量間數。 (C)調查容器檢出病媒蚊比率。 (D)公部門舉發通知單張數。



(A)	27.	我國基層醫療保健的主要服務內容，下列何者最不當？ (A)治療罕見疾病。 (B)傳染病防治。 (C)推動四癌篩檢。 (D)執行疫苗接種。
(D)	28.	為響應國民健康署肺癌早期偵測政策，桃園市自 112 年 3 月起擴大針對 40 歲以上且設籍桃園具有以下那些高風險族群，提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務？ ① 菸品暴露。 ② 長期營養不良。 ③ 職業暴露。 ④ 空汙及油煙。 ⑤ 疾病史或家族史。 (A)②③④⑤ (B)①②③⑤ (C)①②③④ (D)①③④⑤
(B)	29.	傳染病經由不同的傳染途徑由疾病宿主傳給其他人，包括直接傳染及間接傳染，下列何者為直接傳染？ (A)空氣傳染。 (B)飛沫傳染。 (C)糞口傳染。 (D)食品傳染。
(A)	30.	以下何者為非？ (A)酒精性乾洗手對含芽孢的細菌如困難梭狀桿菌是有效的。 (B)群突發的定義：某一地區，某一群人身上，經過一段特定時期，其發生率異常增加，具有統計學的意義，且彼此有關連性(人時地) 或有相同來源。 (C)COVID-19 的傳播途徑與流感相同，主要是透過飛沫傳染，傳播距離為 1-2 公尺。 (D)如果某傳染病打疫苗或感染後的免疫力會隨時間下降，群體免疫的效果將隨時間減弱。



(D)	31.	有關腸病毒相關的敘述，下列何者為非？ (A)目前腸病毒中，除小兒麻痺病毒疫苗及腸病毒 A71 型疫苗外，對於大多數的腸病毒型別，尚無疫苗可供預防。 (B)對於腸病毒有效的消毒方法為含氯漂白水、煮沸及日曬(紫外線)。 (C)典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。 (D)戴口罩就可以完全杜絕感染發生。
(D)	32.	在 2025 衛生福利政策白皮書暨原住民族專章中，為了縮短原住民族平均餘命的差距，可以透過下列哪些指標達成？ (A)降低原住民族嬰幼兒死亡率。 (B)降低原住民族結核病與肝病死亡率。 (C)降低原住民族事故傷害與自殺死亡率。 (D)以上皆是。
(C)	33.	有關新住民懷孕婦女未納健保產檢補助計畫之相關敘述何者為非？ (A)新住民懷孕婦女未納健保產檢的補助對象為配偶為中華民國國民之未納健保新住民懷孕婦女。 (B)計畫目的係保護新住民婦女在未納全民健保前之生育健康，使其於懷孕期間，能受到規律的產前檢查措施，保護其母子健康。 (C)提供補助的產前檢查次數共計 12 次。 (D)第 24-28 週補助妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗。
(A) (C)	34.	下列敘述何者有誤？ (A)騎樓一律屬於菸害防制法規範之禁菸場所。 (B)任何人供應菸品予未滿 18 歲者，可處新台幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰。 (C)下午 9 點以後開始營業且 18 歲以上始能進入之酒吧、視聽歌唱場所不屬於禁菸場所。 (D)老人福利機構於設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室，或其室外場所，不屬禁菸場所。



(C)	35.	下列有關都治計畫的說明何者為非？ (A)藉由都治關懷員執行「送藥到手、服藥入口、吞下再走」的工作。 (B)都治關懷員每週至少執行 5 日（含）以上之關懷服藥。 (C)接受漢生病治療者並非接受執行對象之一。 (D)住院期間由醫療院所醫護人員提供個案住院期間之都治工作，於個案出院前，衛生所可與醫院個案管理人員事前進行個案轉銜交接。
(A)	36.	為簡化民眾對於家庭看護移工的申請，政府提供多元免評認定方式，下列敘述何者為非？ (A)申請家庭看護移工免經醫療機構專業評估對象，增列使用任何一種長期照顧服務（喘息服務、交通接送、輔具服務）持續 6 個月以上。 (B)申請家庭看護移工免經醫療機構專業評估對象包括經 1 名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上（CDR 量表≥ 1）。 (C)針對曾聘僱家庭看護移工且被看護者為 75 歲以上長者，免除反覆再到醫療機構評估。 (D)被看護者持有無註記有效期間身心障礙證明者，免除反覆再到醫療機構評估。
(B)	37.	有關失智症的描述何者為是？ (A)失智症是正常老化的現象。 (B)言語表達或書寫出現困難有可能是失智症警訊之一。 (C)情緒和個性的改變並非失智症可能出現的症狀。 (D)預防心血管疾病無法降低失智症風險。
(A)	38.	執行精神個案追蹤輔導業務，進行個案家訪時，如知悉家戶內之少年有施用毒品者，應立即向地方主管機關通報，至遲不得超過 24 小時，其法源依據為何？ (A)兒童及少年福利與權益保障法。 (B)身心障礙福利法。 (C)精神衛生法。 (D)少年事件處理法。



(A)	39.	參考目前國家的公共政策規劃過程模式，當一個國家政策想推行一個新健康照護政策，而國民認知不足時，下列哪一模式較適合新政策的規劃？ (A)菁英理論模式。 (B)團體理論模式。 (C)民眾參與模式。 (D)以上皆非。
(A)	40.	諾羅病毒 (Norovirus) 是常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，請問下列敘述何者為非？ (A)目前已有疫苗可以施打。 (B)主要感染途徑之一是食入被諾羅病毒污染的食物或飲水。 (C)感染期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質 (D)感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。

