


桃園市觀音區公所統計通報

惡性腫瘤死因分析

111年7月
觀音區公所
會計室

【提要】110年桃園市觀音區區民死亡率為每十萬人口773.95人，其中最主要死亡原因仍以「惡性腫瘤」為首位，其中男性以氣管、支氣管和肺癌最多，女性為結腸、直腸和肛門癌最多。

110年底本區人口數為6萬9,995人，死亡人數為550人。觀察粗死亡率中排序最高之十大死因，本區男、女性皆以惡性腫瘤居首，粗死亡率分別為每十萬人197.0人與122.4人。本區惡性腫瘤下之各項癌症，以氣管、支氣管和肺癌最多，肝和肝內膽管癌次之，但若加以性別分析，男女性主要罹患之惡性腫瘤並不相同。



資料來源：衛生福利部統計處


表1 觀音區主要癌症死亡原因
民國110年

單位：人、每十萬人口、%


順位	男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	16	44.5	29.6	17.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	12	35.8	19.8	25.5
2	C22	肝和肝內膽管癌	14	38.9	24.9	15.4	C25	胰臟癌	9	26.8	15.5	19.1
3	C00-C06, C09-C10,	口腔癌	12	33.4	22.1	13.2	C22	肝和肝內膽管癌	5	14.9	10.4	10.6
4	C15	食道癌	9	25.0	16.8	9.9	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	11.9	7.1	8.5
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	7	19.5	11.3	7.7	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	4	11.9	7.5	8.5
6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6	16.7	10.0	6.6	C50	女性乳癌	3	8.9	5.0	6.4
7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	6	16.7	10.6	6.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	3	8.9	4.0	6.4
8	C25	胰臟癌	5	13.9	7.5	5.5	C64	腎臟癌	2	6.0	3.9	4.3
9	C16	胃癌	3	8.3	4.5	3.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	3.0	1.9	2.1
10	C11	鼻咽癌	2	5.6	4.2	2.2	C71	腦癌	1	3.0	4.3	2.1
		其他	11	30.6	17.4	12.1		其他	3	8.9	5.0	6.4

資料來源：衛生福利部統計處

進一步探討本區惡性腫瘤下之各項癌症，男性以氣管、支氣管和肺癌死亡率每十萬人 44.5 人為癌症之首、肝和肝內膽管癌次之；女性以結腸、直腸和肛門癌死亡率每十萬人 20.0 人為癌症之首，胰臟癌次之。



女性惡性腫瘤死亡人數



資料來源：衛生福利部統計處

本統計通報刊布於觀音區公所首頁 ([http:// www.guanyin.tycg.gov.tw/](http://www.guanyin.tycg.gov.tw/))/
相關資料/會計資料專區/統計業務/應用統計分析