

「枯草桿菌 KHY8」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 5 月 4 日農授防字第 1091488539J 號公告
 中華民國 109 年 5 月 14 日農授防字第 1091488646A 號公告修正
 中華民國 109 年 12 月 31 日農授防字第 1091489901J 號公告修正

1×10⁹ CFU/G 枯草桿菌 KHY8 可濕性粉劑(WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	稻熱病	3 公斤	400	於稻作插秧後 15 天、30 天、40 天、孕穗期及齊穗期，各施用 1 次。		共 5 次				

1×10⁹ CFU/ML 枯草桿菌 KHY8 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
檬果	炭疽病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共 10 次			全株噴濕為準。	
檬果	炭疽病		50	<u>果實包裝前浸泡於藥液約 15 秒後取出於通風處陰乾。</u>					<u>藥液應攪拌均勻。</u>	本項新增。原始登記廠名稱：嘉農企業股份有限公司
檬果	細菌性黑斑病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共 10 次			全株噴濕為準。	