

# 「滅芬百速隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 12 月 31 日農授防字第 1091489901B 號公告

## 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
滅芬百速隆	mefenacet + pyrazosulfuron-ethyl	(1) 2-(1,3-benzothiazol-2-yloxy)-N-methylacetanilide (2) ethyl 5-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-1-methylpyrazole-4-carboxylate

現行百速隆單劑與混合劑之 IUPAC 併修正為

「ethyl 5-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-1-methylpyrazole-4-carboxylate」

## 二、「滅芬百速隆」農藥使用方法與範圍一覽表

3.6% 滅芬百速隆 粒劑(GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	25 公斤		插秧後 5-10 天或雜草 1-2 葉前, 均勻撒佈於田面。					<ol style="list-style-type: none"> <li>防除水稻移植本田雜草。</li> <li>施藥前排水, 施藥後保持積水 3-7 天, 水深 3-5 公分。</li> <li>防除對象: 鴨舌草、稗草、水荳等。</li> </ol>	原始登記廠商名稱: 台灣日產化工有限公司